



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) récence environ 70 000 décès par surdosage d'opioïdes dans le monde chaque année. Ces décès se déroulent dans 70 % des cas en présence d'un témoin. Dans ce contexte, l'OMS a encouragé les autorités de santé à mettre à disposition des personnes à risque d'overdose un antidote la naloxone. En France, la feuille de route 2019-2022 Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes en souligne d'ailleurs l'importance. Cette mise à disposition s'accompagne d'un plan d'information et de formation sur les overdoses. Les décès par overdose sont évitables, la prévention repose sur une meilleure connaissance des risques et une meilleure prise en charge. A partir de juillet 2016, une forme nasale (Nalscue®) a été mise à disposition dans les services spécialisés (CAARUD, CSAPA ou service hospitalier). Depuis juin 2019, une nouvelle forme intramusculaire de naloxone (Prenoxad®) est disponible dans les services spécialisés et également en officine.

### Ce qu'il faut savoir sur le Prenoxad®

- ❑ Prenoxad® est indiqué chez l'adulte dans le traitement d'urgence des surdosages aux opioïdes, caractérisés ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et/ou une dépression du système nerveux central, dans l'attente d'une prise en charge par une structure médicalisée.
- ❑ **Comment l'obtenir en officine et dans les structures? Toute commande s'effectue exclusivement auprès du dépositaire « Centre Spécialités Pharmaceutiques » (CSP) par e-mail ([commande\\_adv@csp-epl.com](mailto:commande_adv@csp-epl.com)) ou fax (04 73 69 89 43 ou 44) en y joignant un bon de commande (modèle non fourni, selon votre convenance). Pour toute demande de renseignement sur les commandes, contactez CSP (téléphone : 04 73 69 97 57). Les commandes de 2 kits ou plus sont exonérées de frais de ports.**
- ❑ Le prix d'achat est de 19,00 euros HT (23,16 euros TTC), remboursé à 65 % en cas de prescription.
- ❑ **Pour recevoir le matériel éducatif (vidéo, brochures, check-list) contacter le laboratoire :** au 06 74 67 10 40 ; mail : [prenoxad@ethypharm.com](mailto:prenoxad@ethypharm.com) ; Internet : <https://www.prenoxad.fr>
- ❑ Avec chaque kit sera transmis une brochure et la carte patient
- ❑ **Contenance du kit :** Un kit → Un patient → Un seul épisode de surdosage
  - ✓ Seringue pré-remplie avec 5 doses de 0,4mg , Injection IM
  - ✓ A chaque utilisation, administrer une dose (correspond à une graduation)

Deux aiguilles à assembler (la 2<sup>ème</sup> aiguille sert si la première est endommagée)

Une notice médicament avec informations et schémas explicatifs




Une seringue (contenant 5 doses délimitées par des lignes noires)

Une boite en plastique rigide pour le transport

- ❑ **Modalités de délivrance**
  - ✓ 1/ Prescription médicale facultative mais remboursée si prescription
  - ✓ 2/ Nécessité de **former** l'utilisateur/tiers à son utilisation, informer des signes de surdosage et de l'importance de contacter les secours
  - ✓ 3/ Remettre au patient la brochure patient et Carte patient

### Que faire en cas d'overdose?



## Ce qu'il faut savoir sur la Naloxone

Antagoniste pur,  
spécifique des récepteurs  
opioïdes  $\mu$

Action rapide, puissante et de **courte durée** ;  
Son action dépend de la dose, la puissance et  
l'intervalle séparant l'administration de  
l'opioïde et de la naloxone

**NALOXONE**

La plupart des opioïdes ont une durée  
d'action plus longue que celle de naloxone

→ **les symptômes d'un surdosage  
peuvent réapparaître à distance d'une  
première amélioration**

une surveillance du patient de plusieurs  
heures en milieu hospitalier est nécessaire

## Ce qu'il faut savoir sur les opioïdes

- En France, d'après le dispositif DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances), la majorité des décès liés à l'abus, implique un opioïde. La 1<sup>ère</sup> substance impliquée est la méthadone (taux de décès 8 fois plus élevé avec méthadone qu'avec buprénorphine). Les décès liés à l'abus impliquent également des antalgiques opioïdes (y compris le tramadol).

### Les facteurs pouvant augmenter le risque de surdosage

#### Quels sont les signes de surdosage ?

##### CONSCIENCE

Troubles de la conscience ou  
**forte somnolence**

Absence de réaction

##### RESPIRATION

Respiration faible ou irrégulière  
**<10 respirations par minute**

Lèvres bleues

##### PUPILLES

Myosis

Consommations associées à  
d'autres sédatifs et  
déprimeurs respiratoires

- ✓ alcool, benzodiazépines, autres opioïdes, gabapentinoïdes (prégabaline, gabapentine) ...

Modalités de  
consommation

- ✓ Puissance pharmacologique de l'opioïde consommé,
- ✓ Voie intraveineuse, dosage important, prise occasionnelle

**FACTEURS**

Individuels

- ✓ Personnes dépendantes ayant une tolérance réduite (après un sevrage, sortant de prison, interruption du traitement, à l'arrêt d'un médicament de substitution aux opioïdes)
- ✓ Personnes ayant des comorbidités associées (hépatique, pulmonaire, VIH, dépression...)

Accès au produit

- ✓ Proche en possession d'opioïdes

### Comment sécuriser la prescription, la délivrance des opioïdes au bénéfice du patient ?

- La mise en place d'un médicament de substitution aux opioïdes est un facteur protecteur du risque de décès. Mais, il existe **deux périodes à risque de surdosage** : **en début de traitement et le mois qui suit l'arrêt.**
- Ne pas banaliser la prescription** des médicaments opioïdes et **évaluer** les modalités d'utilisation par le patient :
  - ✓ Dose, voie d'administration réellement utilisées
  - ✓ Bénéfices attendus et réels
  - ✓ Effets liés à la prise : effets ressentis et effets indésirables
  - ✓ Repérer l'existence d'une tolérance, d'un mésusage (à l'aide de l'échelle POMI), d'une addiction, de facteurs de risque de surdose, de complications sanitaires, de signes de surdosage

## Rôle du pharmacien dans la diffusion de la naloxone

- Jouant un rôle considérable en santé publique, les pharmaciens sont fortement impliqués dans la veille sanitaire et dans la promotion du bon usage des médicaments opioïdes. Ils participent : 1) à sensibiliser les patients/usagers aux risques de surdosage, 2) à promouvoir l'intérêt d'une diffusion large de naloxone auprès des usagers/patients ou tiers et 3) à informer sur les modalités d'usage de naloxone.
- Des documents de formations sont disponibles sur Internet et auprès des laboratoires (en cliquant sur [Nalscue®](#), [Prenoxad®](#) et la formation en ligne « Apprendre en une heure à sauver une vie » de l'association SAFE en cliquant [ICI](#))

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les médicaments et substances psychoactives,  
pour toute déclaration de cas d'abus ou de pharmacodépendance



addictovigilance.fr

le site de l'association Française des centres d'addictovigilance

Bulletin rédigé par le Réseau Français d'Addictovigilance  
Retrouvez votre centre d'addictovigilance sur notre site Internet à la rubrique  
[www.addictovigilance.fr/centres](http://www.addictovigilance.fr/centres)